



МУЛЬТИПЕПТИДНАЯ НЕЙРОСЕНСОРНАЯ ЛИНИЯ БЕЗ ПАРАБЕНОВ И МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА
ЗАВЕРШАЮЩИЕ АКТИВНЫЕ СРЕДСТВА (кремы) PLEYANA® представляет инновационные пептидные технологии – коллекцию интенсивных мультипептидных сывороток. Пептиды модулируют физиологические функции клеток кожи, они доставляют информацию в клетки. Они обладают способностью проникать через слой омертвевших клеток кожи, влияя на жизнедеятельность живых клеток. С помощью пептидных комплексов можно управлять процессами, протекающими в коже, в том числе старением.
В косметологии пептиды являются революционными косметическими ингредиентами, которые взяли на себя мировое лидерство в борьбе за молодую и красивую кожу, это «прорыв» в борьбе против старения кожи.

ACTIVE CREAM WITH RETINOL 0.25%

АКТИВНЫЙ КРЕМ С РЕТИНОЛОМ 0.25% RETINOVACTION

Препарат предназначен для использования в протоколах проведения процедуры пилинга и как самостоятельное интенсивное завершающее средство в омолаживающих и анти-акне программах.

Активные компоненты: Ретинол, Аскорбил Тетраизопальмитат, Натрия Фитат, Молочная Кислота, Пулулан, Бетаин, Керамидный Комплекс, Успокаивающий комплекс.

INCI/Состав: Water, C12-15 Alkyl Benzoate, Glyceryl Caprylate, Caprylic/Capric Triglycerides, Sea Water, Cucurbita Pepo (Pumpkin) Seed Extract, Ceramide 3, Ceramide 6, Ceramide 1, Phytosphingosine, Cholesterol, Sodium Lauroyl Lactylate, Carbomer, Xanthan Gum, Pentylene Glycol, Magnolia Officinalis Bark Extract, Propanediol, Glycerol Citrate/Lactate/Linoleate/Oleate, BHT, BHA, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Betaine, Polyacrylate Crosspolymer-7, Elaeis Guineensis Butter, Phenoxylethanol, Glycerol Laurate, Retinol, Polysorbate 20, Tocopherol Acetate, Pullulan, Lactic Acid, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Extract, Sodium Phytate.

РЕТИНОЛ 0,25% (Швейцария) (стабилизированный)

INCI: Retinol, Polysorbate 20, BHA, BHT

Ретинол – это жирорастворимое соединение, относящееся к классу витаминов, а его свойства используются в косметологии больше 100 лет. Ретинол является одной из форм витамина А, применяется в современной косметологии в стабилизированной форме.

Ретинол является эффективным омолаживающим средством и проявляет следующие свойства:

- пилинговый эффект и более быстрое обновление эпителия за счет участия в регуляции роста и развития клеток. Это происходит в результате легкой диффузии ретиноидов через клеточную мембрану путем связывания со специфическим белком и образования комплексов, включающихся в процессы биосинтеза клеточной РНК
- депигментирующий эффект - ретиноевая кислота уменьшает выраженность гиперпигментации, усиливая и ускоряя обновление клеток эпидермиса. В силу ускорения созревания кератиноцитов уменьшается время контакта меланоцитов с кератиноцитами. Что уменьшает меланосомно-кератиноцитарный трансфер, интенсивность окрашивания кератиноцитов. В результате происходит достаточно быстрое и заметное осветление гиперпигментированных участков кожи
- антиоксидантный эффект и замедление старения клеток путем включения в состав их мембраны и защиты от повреждающего действия токсинов и свободных радикалов
- замедление разрушения коллагеновых волокон, происходящего под влиянием внешних и внутренних факторов, и одновременная стимуляция продукции новых коллагеновых и эластининовых белков фибробластами, благодаря чему восстанавливается и значительно укрепляется матрикс дермы
- торможение процессов фотостарения
- смягчающий эффект связан с тем, что ретиноевая кислота, как было подтверждено недавними исследованиями, способна связываться с сывороточным альбумином, цитокератином 10 (обладающим повышенной жесткостью и синтезируемым в эпидермисе под воздействием ультрафиолета или в отсутствие витамина А) и цитокератином 16 - это усиливает регенерацию и приводит к смягчению и выравниванию рогового слоя. Этими свойствами обусловлено применение ретинола для кожи лица после 30-35 лет в целях замедления физиологического старения и уменьшения проявлений преждевременных деструктивных процессов

Кроме того, действие витамина А и его производных проявляются в:

- подавлении роста злокачественных клеток
- угнетении разрастания себоцитов (клетки сальных желез)
- торможение избыточного разрастания эпителиальных клеток в устьях протоков сальных желез, в результате чего отток секрета из них облегчается
- угнетении активности секреции сальных желез и нормализации биохимического состава кожного сала, являющегося основным субстратом для роста и развития пропионбактерии
- эффекте повышения местного кожного иммунитета
- противовоспалительном действии, обусловленным ингибированием лейкотриена В₄ (биологически активное вещество, принимающее участие в реализации воспаления)

Благодаря такому действию, ретинол является достаточно эффективным средством для проблемной кожи.

В современных косметологии и дерматологии ретинолу отводится ведущее место среди витаминов и других лечебных и антивозрастных средств.

АСКОРБИЛ ТЕТРАИЗОПАЛЬМИТАТ (Маслорастворимое производное витамина С)

INCI: Ascorbyl Tetraisopalmitate

Витамин С как косметический ингредиент имеет множество функций, включая стимулирование синтеза коллагена, предотвращение окисления жиров и отбеливание кожи. Однако, витамин С очень интенсивно окисляется и меняет при этом окраску, что существенно затрудняет его использование в косметике. Для эффективного воздействия используют более стабильные производные витамина. Аскорбил тетраизопальмитат стабилен даже при высоких температурах и хорошо растворяется в маслах.

Маслорастворимое производное витамина С обладает превосходной проникающей способностью сквозь кожный барьер, освобождая при этом чистый витамин С, который активно включается в физиологические процессы. Ингибирует активность тирозиназы и образование меланина в коже, стимулирует синтез коллагена и ингибирует активность энзимов, разрушающих коллаген, ослабляет разрушительное действие УФ излучения на клетки и ДНК, нейтрализует активные формы кислорода, предотвращает перекисное окисление липидов и старение кожи, эффективно стимулирует восстановление клеток кожи.

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА

INCI: Lactic Acid

Молочная кислота образуется во время брожения молочных продуктов, она содержится в квашеной капусте. Используется молочная кислота в косметологии, благодаря ее мягкому воздействию на поверхность эпидермиса. Она улучшает процесс деления клеток и циркуляцию крови по сосудам.

Молочная кислота принадлежит к группе альфа-гидроксикислот, которые составляют основу многих препаратов для химического поверхностного пилинга. Кератолитическое действие. Молочная кислота ослабляет сцепление и разрушает связи между корнеоцитами рогового слоя. Как следствие запускается процесс эксфолиации ороговевших клеток (шелушение) эпидермиса, а это в свою очередь стимулирует пролиферацию элементов базального слоя.

Увлажнение кожи и усиление защитного барьера. Молочная кислота вызывает усиление выработки керамидов, сокращая расход влаги и усиливая защитные барьеры. В юных и живых кератиноцитах (клетки эпидермиса) содержится много увлажняющего фактора, а в погибших кераноцитах – мало. Таким образом, обновляя эпидермис, молочная кислота косвенно влияет на гидратацию кожи, прямое влияние на увлажнение эпидермиса связано с тем, что молочная кислота и сама является компонентом увлажняющего фактора. На молекулярном уровне она, наравне с мочевиной, аминокислотами, пирролидонкарбоновой кислотой входит в основу увлажняющего фактора, связывает воду, задерживая ее на поверхности эпидермиса, способствуя равномерному увлажнению.

Омоложение кожи. Молочная кислота стимулирует пролиферацию и бурную деятельность фибробластов – клеток сосочкового слоя дермы, которые отвечают за синтез волокон межклеточного матрикса и молекул мукополисахаридов (к последним относятся гликозаминогликаны и гиалуроновая кислота). Обновление элементов межклеточного вещества повышает гидратацию и вязкоэластичные свойства дермы, как следствие – повышается тургор кожи, рельеф, улучшается внешний вид. Благодаря этому можно добиться разглаживания мелких мимических морщин.

Кроме вышеописанных эффектов молочная кислота оказывает себостатическое действие, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

ПУЛУЛАН

INCI: Pullulan

Пулулан – растительный полисахарид, полученный методом ферментации, вырабатывается из морских водорослей и используется в пищевой, в фармакологической промышленности и в косметологии. Он безопасен, не имеет агрессивного воздействия.

Свойства: мгновенный подтягивающий эффект, разглаживает кожу, стимулирует синтез коллагена, разглаживает морщины, повышает сопротивляемость кожи к воздействию внешних факторов, ограничивает возможность появления раздражения и аллергической реакции на коже, обладает кондиционирующим эффектом.

Пулулан используется в качестве средства для лифтинга кожи. Компания-производитель пулулана заявляет о немедленном и долгосрочном эффекте лифтинга, благодаря возможности стимулировать и укрепить волокна коллагена в коже. Пулулан обладает отличной адгезией с кожными покровами и благодаря этому мгновенно впитывается кожей. Он создает на коже микрослой, снижающий трансэпидермальную потерю влаги, кроме того имеет свойства антиоксиданта.

БЕТАИН

INCI: Betaine

БЕТАИН относится к классу аминокислот и обладает большим спектром косметических свойств. Основные свойства бетаина: кондиционирование, снятие раздражения, активное увлажнение кожи. Бетаин способен надолго удерживать воду в клетках кожи и уменьшает трансэпидермальную потерю воды. Осмо-защита кожи. Придает коже гладкость, ровность, мягкость, улучшает внешний вид кожи.

Натуральный бетаин, полученный по запатентованной финской технологии, содержит также другое натуральное вещество – инозитол. Инозитол относится к классу сахарных спиртов с витаминными характеристиками. Инозитол является структурной частью клеточных мембран и в составе косметики стимулирует дыхание кожи на клеточном уровне.

Недавние исследования об осмотической стратегии бетаина в клетках человека поддерживают ведущую роль бетаина в максимизировании увлажнения кожи. Биологически разлагаемый продукт, не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

В ISPE (Institute of skin and Product Evaluation) проверены и доказаны следующие свойства натурального бетаина:

- эффективность при терапии морщин
- улучшение эластичности кожи
- улучшение гидратации кожи
- уменьшение трансдермальной потери воды
- противовоспалительный эффект

SK-INFLUX

INCI: ceramide 3, ceramide 6, ceramide 1, phytosphingosine, cholesterol, sodium lauroyl lactylate, carbomer, xanthan gum

Sk-influx – смесь церамидов, холестерина и сфинголипидов (керамиды 3; керамиды 6 и; керамиды 1, фитосфингозин; холестерол, натрия лауроил лактат, карбомер, хантановая смола), имитирующих состав межклеточной липидной прокладки и играющей центральную роль в удержании влаги и обеспечении гладкого рельефа кожи, является идентичным коже липидным концентратом, который восстанавливает защитную функцию барьера кожи.

Состоит из мульти-амеляярных (мембранных) систем, похожих на структуру липидного барьера в роговом слое. Sk-influx – идеальный компонент косметических средств с уникальными свойствами восстановления рогового слоя, увеличения уровня увлажнения и защиты, особенно для очень сухой и чувствительной кожи.

OCALINE PF

INCI: sea water, water, cucurbita pepo (pumpkin) seed extract

Запатентованная смесь двух натуральных ингредиентов: вода морского источника, богатая микроэлементами, и щелочные аминокислоты, полученные из семян cucurbita pepo. Осалне pf – мощный активный успокаивающий ингредиент, который работает с нейтральным воспалением и ограничивает реактивность кожи, повышает уровень влаги в роговом слое, укрепляет липидный барьер кожи, успокаивает раздражение, оказывает антигистаминный эффект (устранение симптомов аллергической реакции), смягчает кожу и уменьшает покраснение.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве активного завершающего средства 1-2 раза в неделю. Крем наносится на сухую очищенную кожу. Только после консультации специалиста при отсутствии противопоказаний и реакции на ретиноиды.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

В течение первых недель использования может наблюдаться сухость и лёгкое шелушение, повышение чувствительности, обусловленные активным обновлением кожи. По мере привыкания эта реакция проходит. Перед первым использованием нанесите несколько капель вещества на локтевую сгиб и подождите минут 40. Если за это время не проявились ярко выраженные побочные эффекты, значит, препарат с ретинолом первично подходит.

При повышенной чувствительности кожи старайтесь не допускать попадания средства на нежную кожу вокруг глаз.

Локальные побочные эффекты применения ретиноидов описываются как «ретиноидная реакция» или ретиноидный дерматит. К сожалению, возникновение этого состояния практически неизбежно, а равно и бурное повышение фоточувствительности с первых дней терапии. Ретиноиды фоточувствительны, не будучи фоточувствительными. В целях снижения интенсивности побочных эффектов рекомендуется учитывать особенности этих веществ. Воздействие ретиноидов всегда дозозависимо, потому для уменьшения выраженности дерматита рекомендуется ограничиться однократными аппликациями, лучше в вечернее время.

Завышенные ожидания, отсутствие готовности к длительному использованию ретиноидов и к неизбежности побочных эффектов в начале терапии – нередко приводят к отказу от использования препаратов и потере лечебного эффекта. Некоторые дерматологи рекомендуют применять увлажняющие и питательные средства в течение 30 минут после аппликации ретиноидов. Кроме того, обязательно использование солнцезащитных средств в течение всего периода использования.

Для достижения эффекта от применения крема с ретинолом, нужно соблюдать некоторые правила, которые помогут максимально оценить эффективность препарата и добиться выраженного результата:

- крем с ретинолом должен храниться в непрозрачной упаковке, так как под воздействием света витамин А разрушается
- кратность применения крема с ретинолом следует увеличивать постепенно, начиная с 1 раза в неделю
- крем с ретинолом следует наносить на сухую кожу, в обратном случае повышаются шансы на возникновение раздражения кожи
- если кожа пациента отреагировала на средство с ретинолом раздражением – следует снизить концентрацию витамина в финишном средстве
- так как витамин А боится света, крем с ретинолом лучше всего наносить вечером, а днем поверх него необходимо использовать косметику с SPF (не менее 20) (Солнцезащитный крем с увлажняющим комплексом для лица spf 30 PLEYANA®). Кроме дополнительного защиты лица, это значительно замедлит окисление ретинола и снизит действие на кожу ультрафиолетового излучения
- на лицо нужно наносить небольшие порции крема, чтобы избежать негативной реакции кожи
- если крем с ретинолом сохнет кожу пациента – через 15-60 минут после его нанесения можно использовать увлажняющее средство (Крем-маска увлажняющая AQUA-INTELLECT PLEYANA®)
- средства с витамином А можно аккуратно наносить под глаза, но нельзя использовать на веках и под бровью, чтобы избежать попадания крема в глаза
- если после нанесения средства кожа сразу же покраснела и стала горячей – его необходимо срочно смыть!
- кислоты хорошо сочетаются с ретинолом, особенно (фитиновая, гликолевая)
- крем с ретинолом нужно использовать максимально быстро после дозирования из емкости, в которой он содержится, так как витамин А разрушается под воздействием кислорода
- емкости с крышками или пипетки необходимо очень плотно закрывать после использования, упаковка в виде вакуумного диспенсера в этом случае имеет абсолютное преимущество
- открытую емкость крема с ретинолом лучше всего хранить в двери холодильника
- крем с ретинолом нельзя использовать время от времени, для достижения оптимального результата необходимо постоянство
- оценивать результаты использования крема с ретинолом можно не раньше, чем через 3 месяца постоянного применения средства, а максимальный результат – через год

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- различные аллергии – указывают на вероятность возникновения чрезмерной реакции кожного покрова на процедуру, чему способствует использование при этом ретинола, повышающего реактивность кожи
- атопические кожные реакции, экземы, себорейный дерматит и др. – указывают на повышенную чувствительность (реактивность) кожного покрова
- вирусные инфекции – способны спровоцировать, при участии ретиноидов и кислот, высыпания герпеса, наблюдающегося у пациентов, ранее перенесших данное заболевание
- бородавки – способны спровоцировать распространение бородавочного вируса
- фоточувствительность – высокая чувствительность кожного покрова к солнечному или другому излучению, имеющему УФ-составляющую
- заболевания печени, камни в желчном пузыре, воспаление поджелудочной железы
- беременность и планирование в ближайший год, а также в период лактации, так как ретиноиды обладают эмбриотоксичностью

Срок годности: 24 месяца.

Дата изготовления: указана на упаковке.

Условия хранения: +5 - +25°C

ГОСТ 31460-2012



Изготовитель/организация уполномоченная на принятие претензий от потребителя:
ООО «Д Лидер-Альянс». Юр. адрес: 115419, РФ, Москва, 2-й Рошинский проезд, д. 8, стр. 4, этаж 4, пом. 1/46.
Тел.: +7 (499) 502-02-00. info@pleyana.com
www.pleyana.com
#выибиропleyana
#pleyana
#retinovation



pleyana



pleyanaofficial